

当院をはじめて来院される患者様で、既に他院で体外受精を行った経験のある方は記入例を参考にIVF サマリーをご記入下さい。お名前等は赤文字の部分だけご記入下さい。

過去の経歴を把握することは、適切な治療方法を選択する上で非常に重要ですので、なるべく正確にご記入をお願いいたします。

注意① 顕微授精では顕微授精を行った数(例では 7 個)と受精した数(例では 6 個)のようにご記入ください。

注意② 凍結胚移植では採卵数は無記入とし、受精数の欄に(融解数)と題して融解個数を記入してください。同じく凍結胚数の欄に(生存数)と題して生存個数を記入してください。

IVF サマリー

妻 ID : _____ 名前 : _____ 年齢 : _____ 歳

生年月日 : _____ 年 _____ 月 _____ 日

結婚年月日 : _____ 年 _____ 月 _____ 日

気管支喘息(無・有) 緑内障(無・有) 薬物アレルギー(無・有: _____)

感染症(無・有: _____)

麻酔既往(無・有: _____) 身長 : _____ cm 体重 : _____ kg

夫 ID : _____ 名前 : _____ 年齢 : _____ 歳

術前検査(済・未) 感染症((無・有: _____)

施行年	施行施設	体外受精の方法	卵巣刺激法	採卵数	受精数	凍結胚数	胚移植数	結果	備考
		顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
		顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
		顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
		顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
		顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
		顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
		顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
		顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
		顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
		顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
		顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	

IVF サマリー

記入例

妻 ID : _____ 名前 : 京野 花子 年齢 : 39 歳

生年月日 : 1964 年 12 月 23 日

結婚年月日 : 1999 年 1 月 1 日

気管支喘息(無・有) 緑内障(無・有) 薬物アレルギー(無・有: _____)

感染症(無・有: _____)

麻酔既往(無・有: _____) 身長 : 155 cm 体重 : 50 kg

夫 ID : _____ 名前 : 京野 太郎 年齢 : 40 歳

術前検査(済・未) 感染症((無・有: _____)

	施行年	施行施設	体外受精の方法	卵巣刺激法	採卵数	受精数	凍結胚数	胚移植数	結果	備考
例	2003.6	レディースクリニック京野	顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植	ロング法	10	8	5	2	妊娠せず 妊娠後流産 出産	
例	2003.9	レディースクリニック京野	顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植	ロング法	9	注意① 6/7	3	2	妊娠せず 妊娠後流産 出産	胎囊数 1個
例	2003.1	レディースクリニック京野	顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植	プレマリン	-	注意② (融解数) 3	(生存数) 3	2	妊娠せず 妊娠後流産 出産	40週3日 2800g 男の子
			顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
			顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
			顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
			顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
			顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
			顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	
			顕微授精 通常の体外受精 凍結胚移植						妊娠せず 妊娠後流産 出産	